



9900 Broadway Ext, Ste #200
Oklahoma City, OK 73114
Phone: 405.608.8833
Fax: 405.608.8818

Cuidado de la incisión/herida después de la cirugía Instrucciones para el cuidado en el hogar

La hinchazón leve y el dolor en el sitio de la incisión pueden ser normales. El dolor disminuirá a medida que la herida sane. Los puntos se disolverán en 2 a 4 semanas.

Cintas estériles

Mantenga las cintas estériles (Steri-Strips) en su lugar. Se caerán solas durante las próximas 2-3 semanas.

Baño

No moje la herida durante al menos 48 a 72 horas después de la cirugía. No sumerja la herida en agua durante al menos una semana después de la cirugía. No frote ni empape la herida.

Antibióticos

Es posible que le receten un antibiótico después de la operación, pero esto no es un requisito. Esto depende del tipo de cirugía que se realice. Muchas veces, no necesitamos ningún antibiótico en el postoperatorio.

Actividad

Espera al menos 2 semanas para volver a las actividades y los deportes extenuantes.

Cuándo llamar al médico

Llame para cualquiera de las señales de infección:

- Secreción amarilla o verde que va en aumento.
- Cambio en el olor de la secreción.
- Cambio en el tamaño de la incisión
- Enrojecimiento o endurecimiento que rodea el área.
- La incisión está caliente al tacto.
- Fiebre.
- Dolor creciente o inusual.
- Sangrado excesivo.

Números para llamar

De lunes a viernes, de 8 a. m. a 4:30 p. m., llame al cirujano de su hijo al (405) 608-8833. Si surgen problemas por la noche después de las 4:30 p. m., los fines de semana y/o los días festivos, llame al (405) 330-4420.

Citas

Esto es específico de la cirugía que se realiza. Llame a nuestra oficina para averiguar cuándo debe hacer un seguimiento después de la cirugía o haga el seguimiento según lo recomiende el cirujano después de la operación. Puede contactarnos llamando al (405) 608-8833.